

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 25-6-68 795389

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

25 Francs

Supplément N° 4 au Bulletin N° 93

20 JUIN 1968

- 24 -

AVERTISSEMENTS -

MILDIOU DE LA VIGNE

VIGNES

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à la maladie.

Dans certaines vignes, notamment de la Vallée du Cher et de la Vallée de la Loire, des attaques parfois très sévères sont observées sur grappes et sur feuilles. Elles sont consécutives aux pluies orageuses et parfois aux brouillards persistants de la fin du mois de Mai et du début du mois de Juin.

Les vignes arrivent au stade de la floraison où elles sont très sensibles à la maladie.

En conséquence, il est nécessaire de terminer de toute urgence, s'il n'a pas encore été appliqué, le traitement conseillé dans notre Bulletin du 17 Juin. Ce traitement est à renouveler, dès que possible, dans toutes les situations où les pluies orageuses ont été suffisamment importantes pour le lessiver.

Dans toutes les vignes où des attaques sur grappes ont été observées il est nécessaire d'effectuer en outre un poudrage cuprique.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Un nouveau traitement est conseillé contre cette maladie. Il pourra être confondu avec celui dirigé contre le Mildiou.

Nous rappelons que la lutte contre le Black-Rot est obligatoire dans toutes les communes déclarées contaminées.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

ARBRES FRUITIERS

Nous rappelons les indications données dans notre bulletin précédent. Dans tous les vergers où l'on observe des taches une nouvelle application est nécessaire dès que le dernier traitement a perdu son efficacité à cause du lessivage par les pluies ou du grossissement des fruits.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

POMME DE TERRE

Des foyers sont actuellement signalés en toutes régions.

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à une extension rapide de la maladie.

En conséquence, il y a lieu de renouveler, dès que possible, le dernier traitement dans tous les cas où celui-ci aura été lessivé par les pluies orageuses localement très abondantes de ces derniers jours.

P.13.1

OIDIUM DE LA VIGNE

Il est recommandé de profiter de la floraison pour effectuer un soufrage.

ARBRES FRUITIERS

ANTHRACNOSE DU CERISIER

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à cette maladie.

Il est donc recommandé d'effectuer un traitement sur toutes les variétés sensibles dont la récolte est terminée, en utilisant une des matières actives suivantes : Doguadine (90 g/hl) ; Phaltane (100 g/hl) ; Manèbe (160 g/hl).

Pour les variétés plus tardives, attendre la fin de la récolte pour effectuer cette application.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE L'OIGNON

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à cette maladie. Il est donc conseillé d'effectuer un traitement en utilisant une des matières actives suivantes : Manèbe (160 g/hl) ; Mancozèbe (160 g/hl) ; Propinèbe (210 g/hl). Ces doses sont valables pour un traitement épandant au moins 800 litres à l'hectare.

Les feuilles cireuses des Alliées étant difficiles à mouiller la pulvérisation devra être particulièrement soignée.

Les pulvérisateurs pneumatiques sont à préférer aux pulvérisateurs mécaniques.

En cas de réduction de la quantité de bouillie répandue à l'hectare les doses à l'hectolitre devront être augmentées dans les mêmes proportions.

MILDIOU DE LA TOMATE

Tant que les conditions climatiques actuelles persisteront la protection des tomates devra toujours être parfaite. On peut utiliser un des produits conseillés pour lutter contre le Mildiou de la Pomme de terre.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

G. BENAS